



# ungewollt schwanger

---

*Informationen zum Thema  
Schwangerschaftsabbruch*



Stadt Graz Frauenreferat  
Netzwerk der österreichischen Frauengesundheitszentren

*Liebe Leserinnen und Leser,*

*alle Angaben in dieser Broschüre wurden sorgfältig erhoben und überprüft. Dennoch besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Denn viele AnbieterInnen wollten oder konnten keine Angabe zu ihren Angeboten machen. Zudem können sich die Preise und Angebote ändern.*

*Wir werden regelmäßig die Angaben auf den Webseiten [www.doku.at](http://www.doku.at) und [www.fgz.co.at](http://www.fgz.co.at) aktualisieren.*

*Diese Broschüre erscheint in verschiedenen Bundesländern mit lokalen Adressen. Die Webversion enthält das vollständige Verzeichnis.*

*Ergänzungen und Korrekturen sind willkommen! Bitte schicken Sie eine E-Mail an [frauen.gesundheit@fgz.co.at](mailto:frauen.gesundheit@fgz.co.at) oder rufen Sie an: Tel. 0316/83 79 98.*

# Inhaltsverzeichnis

---

Vorworte	4
Alles was Recht ist	6
Wann beginnt eine Schwangerschaft?	6
Innerhalb der ersten drei Monate	6
Nach dem dritten Monat	7
Junge Frauen unter 18	8
Frauen leben zyklisch	10
Wann kann frau schwanger werden?	11
Bin ich schwanger?	12
Ungewollt schwanger	14
„Ich dachte, die Welt stürzt ein“	16
Wie werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt?	17
Was kostet ein Schwangerschaftsabbruch?	22
Nach einem Schwangerschaftsabbruch	24
Verhütungsmittel	27
Wie kann ich eine neuerliche Schwangerschaft verhüten?	27
Verhütung im Notfall: Pille danach und Spirale	28
Büchertipps	31
Nützliche Links	34
Adressen	36
Frauengesundheitszentren	36
Weitere Beratungsstellen	38
Wo werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt?	45

# Vorworte

---

*Seit fast 35 Jahren gilt in Österreich die Fristenregelung. Seither ist der Schwangerschaftsabbruch straffrei, wenn er – nach ärztlicher Beratung – in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft erfolgt. Der Weg bis zu dieser Gesetzeslage war ein langer und von einer kontroversiellen Debatte geprägt. Letztlich ist die Einführung der Fristenregelung 1975 ein wichtiger Meilenstein in der Frauenpolitik, denn sie ermöglicht ein körperliches Selbstbestimmungsrecht der Frau.*

*Frauen entscheiden sich nie „leichtfertig“ – wie manchmal nach wie vor unterstellt wird – für einen Schwangerschaftsabbruch. Oft sind es schwierige persönliche Lebensumstände, die zu einer dahingehenden Entscheidung führen. Frauen in Schwangerschaftskonflikten zu helfen, ist unser aller Anliegen und Aufgabe. Es ist daher auch notwendig, durch kompetente Beratung und Hilfestellung, Frauen bei ihrer Entscheidung – egal in welche Richtung – bestmöglich zu unterstützen. Die Broschüre **unge-  
wollt schwanger** versucht in diesem Sinne wichtige Informationen kompakt und übersichtlich aufbereitet darzustellen.*

*Ihre*



*Elke Edlinger  
Frauenstadträtin*

## Ungewollt schwanger – was nun?

*Für Beraterinnen in Frauengesundheitszentren gehört diese Frage zum Arbeitsalltag. Die Frauen, die sie stellen, sind unterschiedlich: jünger oder älter, kinderlos oder mit Kindern, in einer Partnerschaft oder Single, in Ausbildung, im Beruf stehend oder auf Stellensuche, mit mehr oder weniger Geld und Unterstützung durch FreundInnen und Familie ... Ob sie sich für die Fortsetzung der Schwangerschaft entscheiden oder dagegen – ihre Gründe sind vielfältig. Ihre Entscheidung verdient auf jeden Fall Respekt.*

*Die Fristenlösung ermöglicht Frauen, eine Schwangerschaft bis zum Ende des dritten Monats straffrei abbrechen zu lassen. Dies ist ihr Recht. Trotzdem erfahren viele Ablehnung, erhalten nur mit Schwierigkeiten (oftmals falsche) Informationen darüber, wie und wo Abbrüche durchgeführt werden. Weil über Schwangerschaftsabbruch in Österreich kaum geredet wird, müssen Frauen mitunter auch zu hohe Preise zahlen. Qualitätsstandards fehlen überhaupt.*

*Das Netzwerk der österreichischen Frauengesundheitszentren hat daher diese Broschüre erstellt. Damit Frauen ihre eigenen Wege gehen können – und diese weniger steinig sind.*

*Netzwerk österreichischer Frauengesundheitszentren*



# Alles was Recht ist

---

*Frauen haben das Recht, sich eigenverantwortlich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Das österreichische Strafgesetzbuch legt den Rahmen dafür fest.*

### *Wann beginnt eine Schwangerschaft?*

Etwa eine Woche nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle kommt es zur Einnistung in der Gebärmutter der Frau (Nidation). Damit beginnt nach österreichischem Recht eine Schwangerschaft. Daher gelten auch erst nach diesem Zeitpunkt die rechtlichen Regelungen über den Schwangerschaftsabbruch.

### *Innerhalb der ersten drei Monate*

Innerhalb der ersten drei Kalendermonate einer Schwangerschaft ist laut § 97 Strafgesetzbuch unter bestimmten festgelegten Bedingungen ein Abbruch zulässig. Zuvor muss, wie bei jedem medizinischen Eingriff, eine ärztliche Beratung stattfinden. Der Eingriff muss von einer Ärztin oder einem Arzt vorgenommen werden und kann ambulant oder stationär erfolgen. Die schwangere Frau kann die Ärztin oder den Arzt wählen. ÄrztInnen sind aber nicht verpflichtet einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen oder dabei mitzuwirken – es sei denn, der Schwangerschaftsabbruch wäre lebensnotwendig.

### *Nach dem dritten Monat*

In Österreich ist ein Schwangerschaftsabbruch nach dem dritten Kalendermonat nur zulässig, wenn es medizinische Gründe dafür gibt, etwa wenn ernste Gefahr für die Gesundheit der Frau besteht, eine schwere Fehlbildung des Fötus zu erwarten ist oder ein Mädchen, wenn es schwanger wird, das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. In allen anderen Fällen, zum Beispiel aus sozialen Gründen oder nach einer Vergewaltigung, ist ein Schwangerschaftsabbruch nach dem dritten Monat unzulässig und daher strafbar.

Gelegentlich kommt es vor, dass eine Frau oder ein Mädchen eine ungewollte Schwangerschaft spät feststellt oder sich aus anderen Gründen erst nach dem dritten Monat zu einem Abbruch entscheiden kann. In diesen Fällen ist ein Abbruch in Österreich nicht mehr erlaubt. In manchen europäischen Ländern, etwa den Niederlanden, Großbritannien oder Schweden, ist ein so genannter Spätabbruch auch für Frauen aus anderen Ländern legal möglich. Es gibt Kliniken, die sich auf diese Behandlung spezialisiert haben. Eine Übersicht der Kliniken aus den Niederlanden finden Sie auf [www.abtreibung.at](http://www.abtreibung.at)

## Junge Frauen unter 18

*Laut Gesetz gelten Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr als ein-sichts- und urteilsfähig. Der Gesetzgeber geht also davon aus, dass Mädchen die Bedeutung und die Tragweite eines Schwangerschaftsabbruches erfassen (§ 146c Abs 1 und 2 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch).*

*Ambulante Schwangerschaftsabbrüche*, also Abbrüche, die ÄrztInnen in ihrer Ordination oder in einem Ambulatorium durchführen: Junge Frauen ab 14 Jahren können alleine entscheiden und benötigen keine Zustimmung der Erziehungsbe-rechtigten.

### *Schwangerschaftsabbrüche in Krankenhäusern*

Das Krankenanstaltengesetz des jeweiligen Bundeslandes schreibt für operative Eingriffe eventuell die Zustimmung eines Elternteils vor. Falls die Eltern nicht erreichbar sind oder nicht in die Entscheidung einbezogen werden können, dürfen JugendrichterInnen die Zustimmung zum Schwangerschafts-abbruch geben. In den steirischen KAGes Spitälern benötigen junge Frauen unter 18 Jahren die Zustimmung eines Erziehungs-berechtigten.



### *Gesetzestext und Erläuterung*

[www.bodyaction.at/bodyaction\\_download/nationale\\_gesetze/neuregelung\\_der\\_einwilligung\\_von\\_minderjaehrigen\\_in\\_medizinische\\_behandlungen.pdf](http://www.bodyaction.at/bodyaction_download/nationale_gesetze/neuregelung_der_einwilligung_von_minderjaehrigen_in_medizinische_behandlungen.pdf)

Internationale Erfahrungen zeigen: Kompetente geschlechtergerechte Sexualpädagogik, leichter und kostenloser Zugang zu Verhütungsmitteln sowie unabhängige Beratungsstellen verringern die Zahl an ungewollten Schwangerschaften von Mädchen und Frauen.

# Frauen leben zyklisch

---

*Von der Pubertät bis zu den Wechseljahren erleben Frauen monatlich ihren Zyklus. Die Zykluslängen sowie Dauer und Stärke der Regelblutungen sind so unterschiedlich wie die Frauen selbst. Deshalb ist eine Zykluslänge von zum Beispiel 24 Tagen genauso normal wie eine Länge von 36 Tagen.*

Jede Zyklusphase beginnt mit der Regelblutung (Menstruation). Der 1. Tag der Regelblutung ist auch der 1. Zyklustag. Der letzte Zyklustag ist jener Tag vor der nächsten Regelblutung.

Während des Zyklus reifen im Eierstock unter Einfluss des Hormons FSH mehrere *Eibläschen* (Follikel) heran. Sie bilden dabei Hormone, nämlich Östrogene. Ein Eibläschen wird reifer als die anderen. Durch das Hormon LH löst sich die in diesem Bläschen enthaltene Eizelle. Dies ist der *Eisprung*. Die Eizelle wandert danach in den Eileiter.

Die Eihülle verbleibt im Eierstock. Aus ihr entwickelt sich der *Gelbkörper*, dessen Zellen das so genannte Gelbkörperhormon (Gestagen) bilden. Dieses sorgt dafür, dass die *Gebärmutter-schleimhaut* aufgebaut und verstärkt durchblutet wird. Hat keine Verschmelzung mit einer Samenzelle (Spermium) stattgefunden, löst sich die Eizelle auf, etwa wenn eine Frau keinen Geschlechtsverkehr gehabt oder erfolgreich verhütet hat. Die Gebärmutter-schleimhaut wird als *Regelblutung* ausgestoßen – ein neuer Zyklus beginnt.

# Wann kann frau schwanger werden?

*Frauen können schwanger werden in der **Zeit des Eisprungs**. Die Eizelle kann nur in einem Zeitraum von 24 Stunden mit einer Samenzelle verschmelzen.*

Wenn in dieser Zeit oder einige Tage vorher – Samenzellen bleiben bis zu 5 Tage aktiv! – ungeschützter Geschlechtsverkehr stattfindet und Samenzellen durch die Gebärmutter in die Eileiter gelangen, kann es dort zu einer Verschmelzung kommen.

Entgegen den bisherigen Annahmen liegen die fruchtbaren Tage nur bei 30 Prozent der Frauen (bei 30 von 100 Frauen) vollständig im Zeitraum zwischen dem 10. und dem 17. Zyklustag. 70 Prozent der Frauen (70 von 100 Frauen) haben mindestens einen Tag ihrer fruchtbaren Tage schon vor dem 10. oder auch noch nach dem 17. Tag (Wilcox et. al., 2000).

Eine mit einer Samenzelle verschmolzene Eizelle braucht weitere 5 bis 6 Tage, um durch den Eileiter die Gebärmutter zu erreichen und sich dort in der Gebärmutterschleimhaut einzunisten. Etwa eine Woche nach der Verschmelzung ist die Einnistung abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt rechtlich betrachtet die Schwangerschaft. In der Medizin wird das Alter einer Schwangerschaft jedoch immer beginnend mit dem 1. Tag der letzten Regelblutung berechnet.

### Bin ich schwanger?

*Viele Frauen wissen sehr früh, dass sie schwanger sind – die Regelblutung bleibt aus, es ist ihnen morgens übel, die Brüste spannen oder sie fühlen sich erschöpft und müde. Andere Frauen merken keine Anzeichen.*

Frauen, die einen unregelmäßigen Zyklus haben, können sich auch nicht am Kalender orientieren. Dies ist besonders häufig bei sehr jungen Frauen oder bei Frauen zu Beginn der Wechseljahre der Fall. Es kommt auch vor, dass Frauen trotz beginnender Schwangerschaft noch Blutungen haben, die aber meist schwächer als eine normale Regelblutung sind.

*Wenn Sie Anzeichen dieser Art bemerken und auch vermuten, dass Ihre Verhütung nicht zuverlässig gewesen sein könnte, sollten Sie möglichst bald einen Schwangerschaftstest machen. Je früher Sie wissen, dass Sie schwanger sind, umso mehr Zeit haben Sie für Überlegungen, Gespräche und um sich zu informieren.*

Schwangerschaftstest oder Ultraschalluntersuchung geben Frauen Gewissheit, ob sie schwanger sind oder nicht.

### *Schwangerschaftstest*

Die einfachste Art eine Schwangerschaft früh festzustellen ist, das Hormon hCG (Human Choriongonadotropin) im Harn (Urin) nachzuweisen. Es wird im Körper von Frauen fast nur während der Schwangerschaft gebildet und ist schon 10 Tage nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle im Harn feststellbar. ÄrztInnen, Ambulatorien und Frauengesundheitszentren bieten Tests an. Schwangerschaftstests sind auch ab 4€ in Drogeriemärkten und Apotheken erhältlich und können zu Hause durchgeführt werden.

*Wenn der Test keine Schwangerschaft anzeigt, kann das bedeuten, dass Sie nicht schwanger sind. Es kann aber auch sein, dass es zu früh für einen Test ist. Dann ist es sinnvoll, dass Sie nach einer Woche wieder testen. Wiederholen Sie auch dann den Test, wenn Ihre Regelblutung weiter ausbleibt. Wichtig ist, dass Sie in dieser Zeit verhüten. Denn während Zyklusunregelmäßigkeiten können Sie schwanger werden.*

### *Ultraschalluntersuchung*

Mittels Ultraschall kann etwa ab der 5. Schwangerschaftswoche der Fruchtsack festgestellt und damit das Alter der Schwangerschaft berechnet werden.

## Ungewollt schwanger

---

*Wenn Frauen merken, dass sie ungewollt schwanger sind, ist das oft ein Schock. Für manche Frauen schlägt die anfängliche Verwirrung rasch in Freude um. Manche Frauen stellen schnell fest, dass sie in ihrer momentanen Situation kein Kind haben wollen. Andere Frauen sind hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, das Kind zu bekommen, und dem Zweifel, ob es für sie derzeit möglich ist. Wenn der erste Schock weicht, beginnt die Suche nach einer Lösung. Bis zu einer Entscheidung kann es einige Zeit dauern.*

Viele Fragen kreisen im Kopf: Wie soll ich das alleine schaffen? – Was wird aus meiner Ausbildung, meinem Beruf? – Was wird mein Partner dazu sagen? – Ist unsere Beziehung stark genug für ein Kind? – Möchte ich überhaupt ein (weiteres) Kind? – Würde ich einen Schwangerschaftsabbruch verkraften? Innere Wünsche und äußere Umstände stehen häufig miteinander in Streit. Dazu kommt der Druck, innerhalb kurzer Zeit zu entscheiden.

Männer reagieren in dieser Situation nicht immer so, wie sich Frauen das wünschen. Manche Männer sind überfordert, ratlos, verantwortungslos oder fühlen sich schuldig, weil sie nicht besser „aufgepasst“ haben. Ist es möglich, kann es sehr hilfreich sein, die Gedanken und Gefühle miteinander zu teilen und gemeinsam eine Entscheidung zu treffen.

### *Seelische Folgen?*

Ein Schwangerschaftsabbruch umfasst viele verschiedene Erfahrungen. Frauen entscheiden sich aus sehr unterschiedlichen Gründen dafür, zu unterschiedlichen Zeiten ihrer Schwangerschaft und für verschiedene Methoden.

Frauen sind vielfältig. Wissenschaftliche Studien zeigen: Bei einer ungewollten Schwangerschaft ist das Risiko seelische Probleme zu bekommen für die Frauen, die sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entscheiden, gleich groß wie für jene, die die Schwangerschaft austragen.

[www.apa.org/releases/abortion-report.pdf](http://www.apa.org/releases/abortion-report.pdf)

*„Ich dachte, die Welt stürzt ein ...“*

*Die meisten Frauen, die ungewollt schwanger sind, erleichtert es, wenn sie über ihre Gefühle und Zweifel sprechen können. Suchen Sie jemanden, mit dem Sie reden können!*

*FreundInnen und Verwandte erweisen sich häufig als große Stütze. Viele Frauen haben schon einen oder mehrere Abbrüche durchführen lassen, aber bisher nicht darüber gesprochen. Vielleicht möchten Sie sich auch einer Frau anvertrauen, die schon ein Kind hat. Sie kann Ihnen von ihren Freuden und Problemen als Mutter erzählen. Wenn Sie mit unterschiedlichen Personen sprechen, erfahren Sie verschiedene Sichtweisen. Wichtig ist, dass Sie ihren GesprächspartnerInnen vertrauen können!*

*Es kann für Sie auch hilfreich sein, sich an eine unabhängige Beratungsstelle zu wenden (Adressen ab S. 35). Ein Gespräch mit einer einfühlsamen Beraterin bringt Ihnen wahrscheinlich mehr Klarheit. Was auch immer Sie aussprechen oder entscheiden, es ist in Ordnung. Die Beraterin wird Ihnen vielleicht noch Informationen geben oder Sichtweisen vor Augen führen, die Sie nicht bedacht haben. Sie kann Sie stärken – die Entscheidung treffen letztendlich Sie!*



# Wie werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt?

*Nach Schwangerschaftsabbrüchen, die von erfahrenen ÄrztInnen und unter medizinisch einwandfreien Bedingungen durchgeführt werden, treten sehr selten Komplikationen auf. Manchen Frauen macht aber der medizinische Eingriff selbst Angst. Wer die verschiedenen Methoden und ihre Abläufe kennt, kann leichter eine Entscheidung treffen.*

### *Absaugmethode (Saugcurette)*

Sie ist die schonendste und sicherste Methode eines Schwangerschaftsabbruchs und ab der 5. Schwangerschaftswoche möglich. Allerdings führen manche ÄrztInnen sie nicht vor der 7. Woche durch.

### *Ablauf*

Nachdem die Schwangerschaft bestätigt und eine vaginale Untersuchung gemacht wurde, verabreicht die Anästhesistin oder der Anästhesist die wenige Minuten dauernde Vollnarkose oder die Ärztin oder der Arzt betäubt den Gebärmutterhalskanal örtlich. Der Gebärmutterhals wird festgehalten, danach wird dieser Kanal leicht gedehnt und mit einem Plastikröhrchen (Saugcurette) das Schwangerschaftsgewebe und die Schleimhaut aus der Gebärmutter abgesaugt. Anschließend wird mit Ultraschall eine Nachkontrolle durchgeführt, um sicherzugehen, dass keine Gewebereste zurückgeblieben sind.

### **+ Plus**

Dieser Eingriff ist für erfahrene ÄrztInnen einfach durchführbar. Er dauert nur wenige Minuten und ist unter Vollnarkose oder mit örtlicher Betäubung möglich. (Örtliche Betäubung ist in anderen Ländern Standard. In Österreich wird sie nur vereinzelt angeboten.)

### **- Minus**

Die Absaugmethode ist erst dann möglich, wenn ein Fruchtsack im Ultraschall sichtbar ist.

## **Mögliche unerwünschte Wirkungen**

### **Infektion**

Anzeichen dafür sind Körpertemperatur über 37,5 Grad, die mehr als 2 Tage anhält, sowie stärkere Blutungen und Krämpfe.

Behandlung: Bei diesen Symptomen sofort eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Infektionen, die frühzeitig erkannt werden, können schnell und sicher mit Antibiotika behandelt werden.

### **Starke Blutungen**

Eine Blutung nach dem Abbruch ist ganz normal und dauert meist ein bis zwei Wochen. Die Ursache für eine starke Blutung können Geweberückstände in der Gebärmutter sein.

Behandlung: Medikamente, eventuell ist eine Nachcurettage notwendig. Nach einem Abbruch mit der Absaugmethode kommt es in 2 bis 5 Prozent der Fälle (also bei 2 bis 5 von 100 Frauen) zu einem unvollständigen Abbruch.

### ***Verletzung der Gebärmutter***

Eine sehr seltene Komplikation. Sie wird normalerweise von den behandelnden ÄrztInnen sofort erkannt. Meist reicht ein Tag Beobachtung in einem Spital aus. Eventuell ist eine Operation notwendig.

### ***Curettage (Ausschabung)***

#### ***Ablauf***

Mit einer Kürette, einem kleinen löffelförmigen Instrument, wird unter Vollnarkose das Schwangerschaftsgewebe aus der Gebärmutter gelöst und entfernt.

#### ***- Minus***

Als Methode für einen Schwangerschaftsabbruch ist dieser Eingriff veraltet, da nach dem Eingriff unnötig starke Schmerzen auftreten können und er mit Risiken verbunden ist.

### ***Der medikamentöse Abbruch***

Seit Jänner 2000 ist das Medikament Mifegyne® in Österreich zugelassen – jedoch nur in Krankenanstalten, nicht aber, wie in den meisten anderen Ländern, bei niedergelassenen ÄrztInnen.

#### ***Ablauf***

Das Verfahren des Abbruchs dauert meist 3 Tage:

Am ersten Tag nehmen Frauen das erste Medikament, ein Hormon, in Form von 3 Tabletten ein (Mifepristone 600 mg, Handelsname: Mifegyne®). Damit beginnt der Prozess des Abbruchs.

Am dritten Tag wird ein weiteres Hormon, ein Prostaglandin (Misoprostol 400 µg, Handelsname: Cyprostol®) eingenommen. Kurze Zeit danach wird der Fruchtsack ausgestoßen, wobei es zu einer starken Blutung kommen kann. Im Normalfall jedoch ist eine Blutung ähnlich einer normalen Regelblutung zu erwarten. Ein bis zwei Wochen später wird eine medizinische Nachuntersuchung (Ultraschall) durchgeführt, um zu klären, ob die Schwangerschaft tatsächlich beendet wurde.

#### **+ *Plus***

Ein medikamentöser Abbruch ist ab dem Zeitpunkt, an dem Frauen das positive Ergebnis eines Schwangerschaftstests erhalten, bis zur 9. Woche der Schwangerschaft (63 Tage gerechnet ab dem ersten Tag der letzten Regel) möglich. Er ist also früher anwendbar als die Absaugmethode.

#### **- *Minus***

Der Prozess des Abbruchs dauert mehrere Tage. Frauen nehmen mehrere Medikamente ein. Der Fruchtabgang tritt zu Hause ein, er kann schmerzhaft sein.

#### ***Mögliche unerwünschte Wirkungen***

Krampfartige Schmerzen sowie Übelkeit oder Durchfall können auftreten und Schmerzmittel nötig machen.

#### ***Stärkere und längere Blutungen***

In etwa 1 Prozent (bei 1 von 100 Frauen) wird eine Nachbehandlung (Curettage) notwendig, weil der Abbruch unvollständig ist. Die Nachcurettage ist meist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden (je nach Institution unterschiedlich).

***Wann ist ein medikamentöser Abbruch nicht möglich?***

Bei Blutgerinnungsstörungen, bei Erkrankungen der Nebennieren, bei schwerem, nicht therapeutisch kontrolliertem Asthma, bei bereits festgestellter Eileiterschwangerschaft (extrauterine Schwangerschaft) und bei Herz-Kreislaufferkrankungen.

# Was kostet ein Schwangerschaftsabbruch?

Für diese Broschüre haben Mitarbeiterinnen des DOKU GRAZ zahlreiche ÄrztInnen und Kliniken angerufen, um die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch zu erfragen. Die Antworten waren immer wieder ausweichend oder unvollständig. Vereinzelt wurde auch untersagt, den Preis zu veröffentlichen. Die angegebenen Preise reichen von 318,80€ bis 760€ (Mai 2009).

In Österreich muss jede Frau den Schwangerschaftsabbruch selbst zahlen, auch wenn sie über wenig Geld verfügt. Manchmal gibt es Kostenzuschüsse. Informationen dazu erhalten Sie in unabhängigen Beratungsstellen, etwa Frauengesundheitszentren (S. 36–37).

Erfragen Sie auch, was Sie mitbringen sollen.

Das könnte etwa sein:

### *Checkliste Vorbereitung*

- Überweisung
- Schwangerschaftsnachweis (Ultraschallbild)
- Blutgruppenausweis
- Weitere Laboruntersuchungen
- Bestimmte Kleidung
- Binden (Vorlagen)
- ...

Die vollständige Liste von ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, mit allen Angaben liegt in den Frauengesundheitszentren auf. Sie steht außerdem unter [www.fgz.co.at](http://www.fgz.co.at) und [www.doku.at](http://www.doku.at) bereit.

Wenn Sie einen Schwangerschaftsabbruch planen, wollen Sie vermutlich Preise vergleichen. Fragen Sie dafür nach dem Ablauf und folgenden möglichen Kosten:

#### *Checkliste Kosten*

- Aufklärungsgespräch
- Voruntersuchung: gynäkologische Untersuchung mit Ultraschall, bakteriologische Untersuchung, Schwangerschaftstest (kann unter Umständen auch zu Hause gemacht werden)
- Rhesus Test und eventuell Partobulin-Spritze, falls eine Frau einen negativen Rhesusfaktor hat
- Schwangerschaftsabbruch: chirurgische oder medikamentöse Methode, in Vollnarkose oder mit lokaler Betäubung, Medikamente
- Nachuntersuchung
- Tagsatz (In manchen Spitälern werden zwei Tagsätze in Rechnung gestellt. Frauen, die keine Beschwerden haben, können einen Revers unterschreiben und früher das Spital verlassen.)

# Nach einem Schwangerschaftsabbruch

### ***Gönnen Sie sich Ruhe***

*Nach einem Schwangerschaftsabbruch ist aus medizinischer Sicht keine Bettruhe erforderlich. Durch die einsetzende Hormonumstellung könnte es aber sein, dass Sie sich körperlich oder seelisch erschöpft fühlen. Nach zwei Tagen können Sie alles tun – solange Sie das Gefühl haben, es tut Ihnen gut.*

### *Erleichtert und vielleicht auch traurig*

Das Ende einer ungewollten Schwangerschaft kann eine Erleichterung bedeuten. Ängste sind überwunden und Frau hat ihr Leben in die eigene Hand genommen – diese Gefühle lassen die meisten Frauen erst einmal befreit aufatmen.

Es gilt aber auch Abschied von der Schwangerschaft zu nehmen. Damit kann ein Gefühl von Trauer verbunden sein. Dies kann auch erst später auftreten. Manche Frauen empfinden Schuldgefühle.

Für die Verarbeitung danach ist die Zeit davor besonders von Bedeutung. Frauen, die sich mit ihren widersprüchlichen Gefühlen zur ungewollten Schwangerschaft auseinandergesetzt haben und sich selbstbestimmt entscheiden konnten, fühlen sich danach befreit. Andere, für die dies schwierig war, können auch die unterschiedlichen Gefühle nachher schwerer



annehmen. Natürlich ist es auch in dieser Phase möglich, eine Beratungsstelle aufzusuchen, um die Entscheidung mit professioneller Hilfe aufzuarbeiten.

Manchmal bedeutet ein Schwangerschaftsabbruch auch das Ende einer Partnerschaft. Frauen müssen sich dann neu orientieren, das Alleinsein bewältigen und die Enttäuschung verarbeiten. Es kann aber auch gelingen, dass eine gemeinsame Entscheidung die Beziehung stärkt. Einige Frauen haben eine Zeitlang keine Lust auf Geschlechtsverkehr oder sogar Angst davor. Sie brauchen Zeit und Verständnis, bis das Vertrauen zur Verhütung oder auch zum Partner wieder aufgebaut ist.

### *Mögliche körperliche Folgen*

Tests können noch mehrere Wochen eine Schwangerschaft anzeigen, da das Hormon hCG nur langsam aus dem Körper ausgeschieden wird. Fragen, Unklarheiten oder Beschwerden sollten Frauen am besten direkt mit den behandelnden ÄrztInnen besprechen.

#### *Blutungen*

Nach einem Abbruch tritt eine Blutung auf, die meistens nicht stärker als eine durchschnittliche Regelblutung ist. Die Dauer ist unterschiedlich lang. Die Blutung kann nach einem chirurgischen Eingriff am 2. oder 3. Tag nach dem Abbruch stärker sein als am Tag des Abbruchs selbst, kann auch aussetzen und nach ein paar Tagen wieder beginnen. Die meisten Frauen haben 1 bis 2 Wochen nach dem Abbruch Blutungen und danach kurze Zeit noch leichte Schmierblutungen.

### *Krämpfe*

Krämpfe direkt nach einer Absaugung treten nur vereinzelt auf, sind aber meist nicht stärker als bei einer normalen Regelblutung. Ein krampflösendes Schmerzmittel kann helfen. Frauen, bei denen später Krämpfe auftreten, sollten unbedingt ihre Ärztin oder ihren Arzt kontaktieren.

### *Infektion*

Um einer möglichen Infektion vorzubeugen, sollten zwei Tage lang folgende Punkte beachtet werden:

- Nicht baden oder schwimmen. Duschen ist möglich.
- Keine Fremdkörper in die Scheide einführen.
- Kein vaginaler Geschlechtsverkehr. Andere sexuelle Aktivitäten sind, wenn gewünscht, unbedenklich.
- Während der Blutung nur Binden benutzen, keine Tampons.

### *Buchtipp*

Traurig und befreit zugleich – Frauen berichten  
[www.abtreibung.at/pages/Traurig+befreit.html](http://www.abtreibung.at/pages/Traurig+befreit.html)

## Verhütungsmittel

---

*Wie kann ich eine neuerliche Schwangerschaft vermeiden?*

***Nach einem Schwangerschaftsabbruch können Sie sofort wieder schwanger werden. Es ist daher klug, sich Gedanken darüber zu machen, welche Verhütungsmethode nun für Sie passt. Hilfreich sind Gespräche mit Freundinnen, aber auch Beratung durch FrauenärztInnen und in Beratungsstellen. Vielleicht möchten Sie sich auch mit Ihrem Partner besprechen – Frauen werden nicht alleine schwanger.***

*Broschüren und Bücher zu diesem Thema finden Sie auf S. 31, weitere Information und Links auf der Website [www.fgz.co.at/Verhuetung.197.0.html](http://www.fgz.co.at/Verhuetung.197.0.html) und unter [www.verhuetung.info](http://www.verhuetung.info)*

Alle Verhütungsmittel, wie auch eine Sterilisation für Frauen sowie Männer, werden in Österreich nicht von der Krankenkasse übernommen, sondern müssen selbst bezahlt werden.

# Verhütung im Notfall

*Notfallverhütung verhindert eine eventuelle Schwangerschaft kurz nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr, etwa wenn das Kondom geplatzt oder verrutscht ist oder die Pille vergessen wurde. Möglich ist dies durch das Medikament Pille danach oder das Einsetzen einer Spirale.*

## **Pille danach**

Die Pille danach ist eine wirksame Möglichkeit, eine ungewollte Schwangerschaft zu verhüten.

Am Markt sind zwei Präparate: Vikela® und Postinor®. Jedes Medikament kosten circa 17€.

### **Wann**

Die Tablette muss so rasch wie möglich nach dem ungeschützten Verkehr, spätestens jedoch 72 Stunden danach, das sind 3 Tage, eingenommen werden. In den ersten 12 Stunden ist die Wirksamkeit am höchsten.

### **Wie**

Durch das Hormon Gestagen wird der Eisprung im Eierstock verhindert oder verzögert. Da keine Eizelle in einen Eileiter wandert, kann auch keine Verschmelzung mit einer Samenzelle stattfinden. Es kommt zu keiner Schwangerschaft.

Die Notfallverhütung mit der Pille danach wirkt zu 60 bis 90 Prozent (bei 60 bis 90 von 100 Frauen) (WHO Factsheet, 2005).

Allerdings wirkt die Pille danach nur einmal im Zyklus. Hat eine Frau nach Einnahme der Pille danach Geschlechtsverkehr, muss mit Kondom verhütet werden.

Die Pille danach ist nicht so wirksam wie eine regelmäßige Verhütung. Sie ist deshalb kein Ersatz für reguläre Verhütungsmittel.

### Wo

In Österreich ist die Pille danach rezeptpflichtig. Verschrieben werden kann die Pille danach von FrauenärztInnen oder ÄrztInnen für Allgemeinmedizin. Sie ist auch in den gynäkologischen Ambulanzen der Spitäler sowie gegen Rezept in Apotheken erhältlich. Ein Notfallparagraf (§4 Abs 5 RezeptpflichtG) im Apothekengesetz regelt, dass rezeptpflichtige Medikamente auch ohne Rezept abgegeben werden können/sollen. Ein Schreiben des Gesundheitsministeriums (8/2005) weist darauf hin, dass dieser Notfallparagraf auch bei der Pille danach zur Anwendung kommen kann. Diese darf also auch ohne Rezept abgegeben werden. In der Praxis ist es für Frauen aber häufig mühsam bis unmöglich, die Pille danach so schnell zu bekommen, wie es nötig ist. Es ist daher sinnvoll, dass Frauen sie sich im Vorhinein verschreiben lassen, kaufen und damit vorrätig haben. In zahlreichen anderen Ländern wird die Pille danach ohne Rezept abgegeben.

Die Pille danach ist rechtlich kein Schwangerschaftsabbruch. Sie sollte nicht verwechselt werden mit dem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch mit Mifegyne®. Bei diesem wird eine bereits bestehende Schwangerschaft abgebrochen.

Mit der Pille danach hingegen wird das Entstehen einer Schwangerschaft nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr verhindert.

[www.fgz.co.at/Links.199.0.html#content1113](http://www.fgz.co.at/Links.199.0.html#content1113)

### *Mechanisch mittels Spirale*

Auch eine Kupferspirale verhindert, dass sich eine verschmolzene Eizelle in der Gebärmutter einnistet. Frauen können sie durch eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt innerhalb von fünf Tagen nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr einsetzen lassen.

Durch die Reizung der Gebärmutterschleimhaut kann es zu einer leichten Schmierblutung kommen.

## 5. KAPITEL

# Büchertipps

---

Boston Women's Health Book Collective: Unser Körper – unser Leben. Ein Handbuch von Frauen für Frauen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt TB, 2000.

Czerwinski, Claudia; Sottong, Ursula (Hrsg): Kinder kriegt man zusammen - keine auch. Sexualität, Empfängnis, Familienplanung. München: Beck'sche Reihe, 2001.

Diehl, Sarah (Hrsg): Deproduktion. Schwangerschaftsabbruch im internationalen Kontext. Aschaffenburg: Alibri-Verlag, 2007.

Entscheiden Sie sich richtig ... bei Liebe, Sexualität und Verhütung. Broschüre des Wiener Programms für Frauengesundheit, 2007. Kostenlos zu bestellen: Broschürentelefon des Fonds Soziales Wien unter Tel: 05 05 379 -100 oder zum Downloaden: [www.verhuetung.info](http://www.verhuetung.info)

frauen leben. Studie zu Lebensläufen und Familienplanung. Kurzfassung. Hrsg.: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Köln 2000. Bestellung der kostenlosen Broschüre: [order@bzga.de](mailto:order@bzga.de)

Groth, Sylvia: Schwangerschaftsabbruch in Österreich. In: Beckermann, Maria J.; Perl, Friderike M.: Frauen-Heilkunde und Geburts-Hilfe. Basel: Schwabe, 2004, S. 916-919.

Hatcher, Robert A. u.a.: Contraceptive Technology, 2007, [www.contraceptivetechnology.com](http://www.contraceptivetechnology.com) (Das medizinische Standardwerk zu Verhütung)

Klein, Debby; Kaufmann, Tara: Schwanger – was nun? Entscheidungshilfen für den persönlichen Weg. München: Kösel, 1999.

Knopf, Marina; Mayer, Elfie; Meyer, Elsbeth: Traurig und befreit zugleich. Psychische Folgen des Schwangerschaftsabbruchs. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt TB, 2000. (Vergriffen, als PDF verfügbar: [www.abtreibung.at/pages/Traurig+befreit.html](http://www.abtreibung.at/pages/Traurig+befreit.html))

Langsdorff, Maja: Kleiner Eingriff – großes Trauma? Schwangerschaftskonflikte, Abtreibung und die seelischen Folgen. Norderstadt: Books on Demand, 2000.

Lindner, Rupert (Hrsg.): Liebe, Schwangerschaft, Konflikt und Lösung. Erkundungen zur Psychodynamik des Schwangerschaftskonflikts. Heidelberg: Mattes, 2008.

Lunneborg, Patricia: Jetzt kein Kind. Warum Abtreibung eine positive Entscheidung sein kann. Weinheim: Beltz TB, 2002.

Meyer, Elsbeth; Paczensky, Susanne von; Sadrozinski, Renate: Das hätte nicht noch mal passieren dürfen! Wiederholte Schwangerschaftsabbrüche und was dahintersteckt. Frankfurt/Main: Fischer TB, 1991.

NAF Textbook: A Clinician's Guide to Medical and Surgical Abortion. (Dies ist das einzige Fachbuch zum Schwangerschaftsabbruch. Das Buch ist derzeit vergriffen, aber eine Neuauflage



ist in Arbeit. Die wichtigsten Kapitel können als PDF heruntergeladen werden: [www.prochoice.org/education/resources/textbook.html](http://www.prochoice.org/education/resources/textbook.html))

Prävention von Schwangerschaften bei Minderjährigen. Hrsg.: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Köln 2007. Bestellung des kostenlosen Informationspakets zu Erkenntnissen, Fakten und Maßnahmen: [order@bzga.de](mailto:order@bzga.de)

Report of the APA Task Force on Mental Health and Abortion 2008: [www.apa.org/releases/abortion-report.pdf](http://www.apa.org/releases/abortion-report.pdf) , acc 19.5.2009.

Sichergehn. Verhütung für sie und ihn. Hrsg.: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Köln 2008. Bestellung der kostenlosen Broschüre: [order@bzga.de](mailto:order@bzga.de)

Wilcox, Allen J; David Dunson, Donna Day Baird: The timing of the "fertile window" in the menstrual cycle: day specific estimates from a prospective study. *British Medical Journal* 2000, 321, 1259-1262.

# Nützliche Links

---

### *Schwangerschaftsabbruch*

[www.abtreibung.at](http://www.abtreibung.at)

[www.gynmed.at](http://www.gynmed.at)

[www.abtreibung-web.de](http://www.abtreibung-web.de) (Schwangerschaftsabbruch in Deutschland)

[www.svss-uspda.ch](http://www.svss-uspda.ch) (Schweizerische Vereinigung für das Recht auf freie Entscheidung)

[www.stisan.nl](http://www.stisan.nl) (Kliniken in den Niederlanden, niederländisch)

[www.rutgersstimezoned.nl/Dindex.htm](http://www.rutgersstimezoned.nl/Dindex.htm) (Kliniken in den Niederlanden, deutsch)

[www.fiapac.org](http://www.fiapac.org) (Internationale Vereinigung von Fachkräften und Verbänden zu Schwangerschaftsabbruch und Kontrazeption)

[www.abortionfilms.org](http://www.abortionfilms.org) (Filme zum Thema Abbruch)

### *Verhütung*

[www.verhuetung.info](http://www.verhuetung.info)

[www.oegf.at](http://www.oegf.at) (Österreichische Gesellschaft für Familienplanung)

[www.netdokter.at](http://www.netdokter.at)

[www.profamilia.de](http://www.profamilia.de) (deutsche Online-Plattform für selbstbestimmte Sexualität)

[www.kessel-marketing.de](http://www.kessel-marketing.de) (Versand von Kondomen, Diaphragmen, Muttermundkappen zur Verhütung und Unterrichtsbehelfen für Sexualerziehung)

*Verhütung im Notfall*

[www.pille-danach.at](http://www.pille-danach.at)

*Mehrsprachige Materialien zu Schwangerschaftsabbruch und Verhütung*

[www.profamilia.de/shop/index.php?cmd=artlist&q=21](http://www.profamilia.de/shop/index.php?cmd=artlist&q=21)

*Informationen für junge Frauen und Männer*

[www.loveline.de](http://www.loveline.de)

[www.frauenarztbesuch.de](http://www.frauenarztbesuch.de)

[www.bravo.de](http://www.bravo.de)

*Information für Frauen mit körperlicher Behinderung*

[www.cebeef.com](http://www.cebeef.com)

## Adressen

---

### Frauengesundheitszentren

**Frauengesundheitszentrum**

Joanneumring 3/1, 8010 Graz

Tel.: 0316/83 79 98

Fax: 0316/83 79 98-25

E-Mail: [frauen.gesundheit@fgz.co.at](mailto:frauen.gesundheit@fgz.co.at)

[www.fgz.co.at](http://www.fgz.co.at)

**Frauengesundheitszentrum F.E.M.**

(Frauen Eltern Mädchen)

an der Semmelweis Frauenklinik

Bastiengasse 36-38, 1180 Wien

Tel.: 01/47 615-5771

Fax: 01/47 615-5779

E-Mail: [fem@aon.at](mailto:fem@aon.at)

[www.fem.at](http://www.fem.at)

**Frauengesundheitszentrum F.E.M. Süd**

im Kaiser Franz Josef-Spital

Kundratstraße 3, 1100 Wien

Tel.: 01/60 191-5201

Fax.: 01/60 191-5209

E-Mail: [femsued.post@wienkav.at](mailto:femsued.post@wienkav.at)

[www.fem.at](http://www.fem.at)

### **Frauengesundheitszentrum ISIS**

Alpenstraße 48 (Zentrum Herrnau), 5020 Salzburg

Tel.: 0662/44 22 55

Fax: 0662/44 22 55-50

E-Mail: [office@fgz-isis.at](mailto:office@fgz-isis.at)

[www.frauengesundheitszentrum-isis.at](http://www.frauengesundheitszentrum-isis.at)

### **Frauengesundheitszentrum Kärnten GmbH**

Völkendorfer Straße 23, 9500 Villach

Tel.: 04242/53 055

Fax: 04242/53 055-15

E-Mail: [fgz.sekretariat@fgz-kaernten.at](mailto:fgz.sekretariat@fgz-kaernten.at)

[www.fgz-kaernten.at](http://www.fgz-kaernten.at)

### **Linzer Frauengesundheitszentrum**

Kaplanhofstraße 1, 4020 Linz

Tel.: 0732/77 44 60

Fax: 0732/77 44 60-60

E-Mail: [office@fgz-linz.at](mailto:office@fgz-linz.at)

[www.fgz-linz.at](http://www.fgz-linz.at)

### **Frauengesundheitszentrum Wels**

Kaiser-Josef-Platz 52/1, 4600 Wels

Tel.: 07242/35 16 86-18 oder -19

Mobil: 0699/19 12 12 19

Fax: 07242/35 16 86-22

E-Mail: [fgz@pga.at](mailto:fgz@pga.at) oder [fgz-wels@pga.at](mailto:fgz-wels@pga.at)

[www.fgz.at](http://www.fgz.at)

### Weitere Beratungsstellen

Eine Liste mit allen Angaben wie Beratungsangebot, Kosten sowie Warte- und Öffnungszeiten, finden Sie unter [www.fgz.co.at](http://www.fgz.co.at) und [www.doku.at](http://www.doku.at). Sie können sie auch in einem österreichischen Frauengesundheitszentrum (S. 36, 37) anfordern. Oder Sie erfragen die unterschiedlichen Angebote telefonisch direkt bei den Beratungsstellen, bevor Sie sich entscheiden.

#### *Beratungstellen im Burgenland*

##### **Frauenberatungsstelle Oberwart**

Spitalgasse 5, 7400 Oberwart

Tel.: 03352/33 855

E-Mail: [frauenberatung-oberwart@utanet.at](mailto:frauenberatung-oberwart@utanet.at)

[www.frauenberatung-oberwart.at](http://www.frauenberatung-oberwart.at)

##### **Frauenberatungsstelle Güssing**

Hauptstraße 26, 7540 Güssing

Tel.: 03322/43 001

E-Mail: [frauenberatung-guessing@aon.at](mailto:frauenberatung-guessing@aon.at)

[www.frauenberatung-guessing.at](http://www.frauenberatung-guessing.at)

## *Beratungsstellen in Kärnten*

### **Frauenberatung Belladonna**

Villacher Ring 21/2, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/51 12 48

E-Mail: [frauenberatung.belladonna@aon.at](mailto:frauenberatung.belladonna@aon.at)

[www.frauenberatung-belladonna.sid.at](http://www.frauenberatung-belladonna.sid.at)

### **Frauenberatung Villach**

Peraustraße 23, 9500 Villach

Tel.: 04242/24 609

E-Mail: [info@frauenberatung-villach.at](mailto:info@frauenberatung-villach.at)

[www.frauenberatung-villach.at](http://www.frauenberatung-villach.at)

### **Frauenservice und Familienberatungsstelle Wolfsberg**

Johann-Offner-Straße 1, 9400 Wolfsberg

Tel.: 04352/52 619

E-Mail: [frauenfamilienber@fraueninfo.at](mailto:frauenfamilienber@fraueninfo.at)

[www.fraueninfo.at](http://www.fraueninfo.at)

### **WIFF Frauen- Familienberatung**

Hauptplatz 2, 9100 Völkermarkt

Tel.: 04232/47 50

Mobil: 0676/69 43 319

E-Mail: [wiff.vk@aon.at](mailto:wiff.vk@aon.at)

## *Beratungsstellen in der Steiermark*

### **Frauengesundheitszentrum**

Joanneumring 3/1, 8010 Graz

Tel.: 0316/83 79 98

Fax: 0316/83 79 98-25

E-Mail: [frauen.gesundheit@fgz.co.at](mailto:frauen.gesundheit@fgz.co.at)

[www.fgz.co.at](http://www.fgz.co.at)

### **Beratungszentrum für Schwangere**

#### **Fachstelle für Schwangerschaft und die Zeit danach**

Leonhardstraße 114, 8010 Graz

Tel.: 0316/80 15 400

E-Mail: [schwangerenberatung@caritas-graz.at](mailto:schwangerenberatung@caritas-graz.at)

[www.schwangerenberatung.at](http://www.schwangerenberatung.at)

### **Frauenservice Graz**

Idlhofgasse 20, 8020 Graz

Tel.: 0316/71 60 22

E-Mail: [office@frauenservice.at](mailto:office@frauenservice.at)

[www.frauenservice.at](http://www.frauenservice.at)

### **Familienberatungsstelle an der Geburtshilflich- gynäkologischen Universitätsklinik Graz**

Auenbruggerplatz 14, 8036 Graz

Tel.: 0316/385-28 88



**Familienberatungsstelle Geburtsklinik Feldbach**  
Ottokar-Kernstockgasse 18, 8330 Feldbach  
Tel.: 03152/899

**Familienberatungsstelle Deutschlandsberg,**  
**Geburtshilflich-Gynäkologische Abteilung im LKH**  
Radlpaßstraße 29, 8530 Deutschlandsberg  
Tel.: 03462/44 11-0

### *Beratungsstellen in Tirol*

**AEP**  
**Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft**  
Müllerstraße 26  
6020 Innsbruck  
Tel.: 0512/57 37 98

**DOWAS für Frauen**  
Adamgasse 4/2  
6020 Innsbruck  
Tel.: 0512/56 24 77

**Zentrum für Ehe- und Familienfragen**  
Anichstraße 24/2. Stock  
6020 Innsbruck  
Tel.: 0512/58 08 71

## *Beratungsstellen in Wien*

### **Familienplanungsstelle im Sozialmedizinischem Zentrum Süd im Kaiser Franz Josef-Spital**

Kundratsstraße 3, 1100 Wien

Tel.: 01/60 191-4730

### **Familienplanungsstelle Hanusch Krankenhaus**

Heinrich Collin Straße 30, 1140 Wien

Tel.: 01/91 021-84 853

### **Familienplanungsstelle der Universitätsklinik für Frauenheilkunde**

Währinger Gürtel 18-20, Ebene 8/Leitstelle 8c, 1090 Wien

Tel.: 01/40 400-2851

### **Familienplanungsstelle Heiligenstädterstraße**

Mollardgasse 8, 1060 Wien

Tel.: 01/40 00 90 935

E-Mail: [familienplanung@wien.gv.at](mailto:familienplanung@wien.gv.at)

### **Verein Lefö**

Kettenbrückengasse 15/2/4, 1050 Wien

Tel.: 01/58 11 880

E-Mail: [office@lefoe.at](mailto:office@lefoe.at)

[www.lefoe.at](http://www.lefoe.at)

**Frauenberatungsstelle Lehargasse**

Lehargasse 9/2/17, 1060 Wien

Seitenstettengasse 5/7, 1010 Wien

Tel.: 01/58 76 750

E-Mail: [beratung@frauenberatenfrauen.at](mailto:beratung@frauenberatenfrauen.at)

[www.frauenberatenfrauen.at](http://www.frauenberatenfrauen.at)

**Familienplanungsstelle der Semmelweis Frauenklinik/  
Department KH Rudolfstiftung**

Bastiengasse 36-38, 1180 Wien

Tel.: 01/47 615-3903

[www.oegf.at](http://www.oegf.at)

**Familienplanungsstelle im Gesundheitszentrum Wien Mitte**

Strohgasse 28/2, 1030 Wien

Tel.: 01/60 12 240 -336

[www.oegf.at](http://www.oegf.at)

**first love Beratungsstelle für Jugendliche von 14 bis 18  
Rudolfstiftung**

Juchgasse 25, 1030 Wien

[www.firstlove.at](http://www.firstlove.at)

**first love Beratungsstelle für Jugendliche von 14 bis 18  
im Donauspital/ SMZ Ost**

Langobardenstraße 122, 1220 Wien

[www.firstlove.at](http://www.firstlove.at)

## *Beratungsstellen in Vorarlberg*

### **Ehe- und Familienzentrum**

Herrengasse 4

6800 Feldkirch

Tel.: 05522/74 139

E-Mail: [efz@kath-kirche-vorarlberg.at](mailto:efz@kath-kirche-vorarlberg.at)

[www.efz.at](http://www.efz.at)

### **IfS-Beratungsstelle Bregenz**

St. -Anna-Straße 2

6900 Bregenz

Tel.: 05574/42 890

### **schwanger.li**

Bahnhofstr. 18

6800 Feldkirch

Tel.: 0810/00 33 44

E-Mail: [info@schwanger.li](mailto:info@schwanger.li)

[www.schwanger.li](http://www.schwanger.li)

# Wo werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt?

---

Eine Liste mit Adressen aus ganz Österreich sowie Angaben zu notwendigen Unterlagen, (Zusatz-)Kosten, psychologischen (Nach-)Betreuungsangeboten, Öffnungs- und Wartezeiten finden Sie unter [www.fgz.co.at](http://www.fgz.co.at) sowie unter [www.doku.at](http://www.doku.at). Sie können sie auch in einem österreichischen Frauengesundheitszentrum (S. 36, 37) anfordern.

### *Kärnten*

#### **IR-Institut Dr.med.univ. Bernd Ellersdorfer**

Villacherstraße 1a/9, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0664/49 48 611

Methoden: Saugcurettage mit Vollnarkose

#### **Dr. Dietmar Pacher**

Ordination, Klagenfurterstraße 20, 9500 Villach

Tel.: 04242/22 255

Mobil: 0676/63 89 755

Methoden: medikamentöser Abbruch, Saugcurettage mit Vollnarkose

## *Steiermark*

### **Geburtshilflich- Gynäkologische Universitäts-Klinik Graz**

Auenbruggerplatz 14, 8036 Graz

0316/385-22 70

Method: medikamentöser Abbruch, Saugcurettage mit Vollnarkose

### **Dr.med.univ. Andreas Glasner**

#### **Ärztzentrum Seiersberg**

Premstätterstraße 1, 8054 Seiersberg

Tel.: 0316/28 97 40

E-Mail: andreas.glasner@chello.at

www.dr-glasner.at

Method: Saugcurettage mit Vollnarkose

### **Dr. Walter Kobor**

Haydngasse 3, 8010 Graz

Tel.: 0316/82 68 26

www.gynäkologe.org

Method: Saugcurettage mit Vollnarkose

## *Tirol*

### **Dr. Hans Joachim Wolf**

Valiergasse 62

6020 Innsbruck

Tel.: 0512/35 35 34

E-Mail: [praxis@drwolf.at](mailto:praxis@drwolf.at)

[www.drwolf.at](http://www.drwolf.at)

Method: medikamentöser Abbruch, Saugcurette mit Vollnarkose

### **Dr. Georg Soier**

Honoldstraße 14/2

6020 Innsbruck

Tel.: 0512/34 76 22

Method: medikamentöser Abbruch, Saugcurette mit Vollnarkose

## Wien

### **Krankenhaus Rudolfstiftung, Gynäkologische Ambulanz**

Juchgasse 25, 1030 Wien

Tel.: 01/71 165-4741

[www.wienkav.at/kav/kar](http://www.wienkav.at/kav/kar)

Methode: Keine Angabe

### **Wilhelminenspital, Gynäkologische Ambulanz**

Montleartstraße 37, 1060 Wien

Tel.: 01/49 150-4710

[www.wienkav.at/kav/will](http://www.wienkav.at/kav/will)

Methode: Keine Angabe

### **Krankenanstalt Sanatorium Hera**

Löblichgasse 14, 1090 Wien

Tel.: 01/31 350-45 623

[www.hera.co.at](http://www.hera.co.at)

Methode: Saugcurettage mit Vollnarkose

### **Gynmed Ambulatorium für Schwangerschaftsabbruch und Familienplanung**

Mariahilfergürtel 37, 1050 Wien

Tel.: 0699/17 81 78 00

[www.gynmed.at](http://www.gynmed.at)

Methode: medikamentöser Abbruch, Saugcurettage mit örtlicher Betäubung oder Narkose



**Pro:Woman Ambulatorium –  
Sexualmedizin und Schwangerenhilfe**

Fleischmarkt 26, 1010 Wien

Tel.: 01/51 29 631

[www.prowoman.at](http://www.prowoman.at)

Methode: medikamentöser Abbruch, Saugcurette mit Vollnarkose oder mit örtlicher Betäubung

**Sozialmedizinisches Zentrum Süd/Kaiser Franz Josef-Spital, Gynäkologische Ambulanz**

Kundratstraße 3, 1100 Wien

Tel.: 01/60 191-99 94 778

Tel.: 01/60 191-47 36

[www.wienkav.at/kav/kfj](http://www.wienkav.at/kav/kfj)

Methode: Keine Angabe

**Sammelweis Frauenklinik, Department der Krankenanstalt Rudolfstiftung, Gynäkologische Ambulanz**

Bastiengasse 36–38, 1180 Wien

Tel.: 01/47 61 50

[www.wienkav.at/kav/sem](http://www.wienkav.at/kav/sem)

Methode: Keine Angabe

**Krankenhaus Hietzing mit neurologischem Zentrum Rosenhügel, Gynäkologische Ambulanz**

Wolkersbergenstraße 1, 1130 Wien

Tel.: 01/80 110-2717

[www.wienkav.at/kav/khl/](http://www.wienkav.at/kav/khl/)

Methode: Keine Angabe

## *Vorarlberg*

### **Ärztelhaus Montfort**

#### **Langzeitverhütung-Konfliktschwangerschaft**

Jahnstraße 20

6900 Bregenz

Tel.: 05574/42 955

E-Mail: ememha@aerztehaus-montfort.eu

www.aerztehaus-montfort.eu

Methodel: Saugcurettage mit Vollnarkose, medikamentöser  
Abbruch aus rechtlichen Gründen in der zugehörigen Praxis in  
Lindau

### **Dr. Robert Zajac**

Angelika-Kauffmann-Straße 8/3

6845 Hohenems

Tel.: 0664/30 84 201

Methodel: Saugcurettage mit Vollnarkose

# Impressum

---

Herausgegeben vom Frauenreferat der Stadt Graz

Inhalt und Rechte :

Netzwerk der österreichischen Frauengesundheitszentren

Recherche und Aktualisierung: Frauengesundheitszentrum,  
Graz, und Frauendokumentations- und Projektzentrum  
DOKU GRAZ

Recherche der Adressen in Tirol und Vorarlberg: Mag.<sup>a</sup> Sabine  
Kessler, Geschäftsführerin FEMAIL, Fraueninformationszent-  
rum Vorarlberg e.V.

Lektorat und Grafik: Frauengesundheitszentrum, Graz

Medizinische Beratung: Univ.Prof.<sup>in</sup> Dr.<sup>in</sup> med. Éva Rásky

Juristische Beratung: Dr.<sup>in</sup> jur. Karin Prutsch

2000 Stück aufgelegt im August 2009

Aktualisierte und bearbeitete Neuauflage der Broschüre

**Ungewollt schwanger – Was nun?** des Netzwerkes der  
österreichischen Frauengesundheitszentren, 2002.

Nachbestellung:

Frauenreferat der Stadt Graz, Keesgasse 6, 8010 Graz

Tel.: 0316/872-4671, E-Mail: frauenreferat@stadt.graz.at